

清胆糖浆

Qingdan Tangjiang

【处方】 枳实 78g 姜半夏 47g 丹参 78g
连翘 75g 蒲公英 156g 黄芩 42g
金银花 78g 竹叶柴胡 78g

【制法】 以上八味，除金银花外，取枳实等七味加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次加入金银花，煎煮 1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至每 1ml 相当于原生药 2g，滤过，滤液浓缩至相对密度 1.10~1.15(60℃)，加入蔗糖 500g 及苯甲酸钠 3g，煮沸使溶解，滤过，加水至 1000ml，搅匀，即得。

【性状】 本品为棕褐色的黏稠液体；气微香，味甜、苦。

【鉴别】 (1) 取本品 30ml，加水 60ml 稀释，转移至分液漏斗中，用正丁醇振摇提取 2 次，每次 30ml，合并正丁醇液，置水浴上蒸干，残渣加水 10ml 使溶解，通过聚酰胺柱(2.5g，60~90 目，柱内径为 1.5cm，干法装柱)，用水 25ml 洗脱，收集洗脱液，置水浴上蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取辛弗林对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(中国药典 2025 年版四部通则 0502)试验，吸取供试品溶液 10 μ l，对照品溶液 5 μ l，分别点于同一含 4%醋酸钠的羧甲基纤维素钠溶液为黏合剂的硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-浓氨试液(20:5:1.5)的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 0.5%茚三酮乙醇溶液，热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

(2) 取本品 20ml，加水 60ml 稀释，转移至分液漏斗中，用水饱和的正丁醇振摇提取 3 次，每次 30ml，合并正丁醇液，用氨试液洗涤 2 次，每次 30ml，弃去氨试液；用正丁醇饱和的水洗涤 2 次，每次 30ml，弃去水液，正丁醇液置水浴上蒸干，残渣加水 20ml 溶解，用乙酸乙酯振摇提取 3 次，每次 30ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取连翘苷对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(中国药典 2025 年版四部通则 0502)试验，吸取供试品溶液 10 μ l，对照品溶液 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-冰醋酸(17:2:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%香草醛硫酸溶液，105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 相对密度 应不低于 1.16(中国药典 2025 年版四部通则 0601)。

其他 应符合糖浆剂项下有关的各项规定(中国药典 2025 年版四部通则 0116)。

【功能与主治】 清热、利湿、利胆。用于胆经湿热所致的胆系感染、胆石症。

【用法与用量】 口服。一次 20ml，一日 3 次。

【规格】 每瓶装 250ml

【贮藏】 密封。

湖北省药品标准公示稿