

桑椹滋阴膏

Sangshen Ziyin Gao

【处方】 熟地黄 120g 女贞子 120g 墨旱莲 120g
桑椹子 240g 玉竹 120g 桑叶 120g

【制法】 以上六味，加水煎煮两次，第一次煮沸后 40 分钟，第二次煮沸后 30 分钟；合并煎液，静置沉淀，滤过，滤液浓缩成相对密度约为 1.22（70℃）清膏，加适量转化糖，混匀，浓缩至规定的相对密度，即得。

【性状】 本品为黄褐色稠厚的半流体；味甜。

【鉴别】 取本品 20g，加硅藻土（约 10~12g），拌匀，加甲醇 40ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液蒸至近干，残渣加水 20ml 使溶解，用水饱和的正丁醇振摇提取 2 次，每次 20ml，合并正丁醇液，用氨试液洗涤 2 次，每次 20ml，弃去氨洗液，取正丁醇液，用正丁醇饱和的水洗涤 2 次，每次 20ml，弃去水洗液，正丁醇液水浴蒸干，残渣加甲醇 0.5ml 使溶解，作为供试品溶液。另取墨旱莲对照药材 1g，加水 100ml，煎煮 30 分钟，放冷，滤过，滤液浓缩至 20ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，分别吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以二氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-水（30:40:15:3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 2% 香草醛硫酸溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 相对密度 应不低于 1.38（中国药典 2025 年版四部通则 0601）。

其他 应符合煎膏剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0183）。

【功能与主治】 滋补肝肾，益精填髓。用于头昏目眩、口渴咽干、潮热盗汗、腰膝酸软。

【用法与用量】 口服。一次 15ml，一日 2 次。

【规格】 每 1ml 相当于饮片 0.84g。

【贮藏】 密封，置阴凉处。