

少腹逐瘀片

Shaofu Zhuyu Pian

【处方】 当归 152g 川芎 152g 蒲黄 152g
五灵脂 152g 干姜 104g 小茴香 104g
桂枝 152g 赤芍 208g 乌药 208g
延胡索 152g

【制法】 以上十味，当归、延胡索粉碎成细粉，过筛，混匀；其余川芎等八味加水煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至稠膏状，加入上述细粉，混匀，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣或薄膜衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后，显棕褐色；气微香，味苦，微辛。

【鉴别】 取本品 10 片，除去包衣，研细，加乙醚 20ml，超声提取 2 次，每次 20 分钟，合并乙醚液，蒸干，残渣加乙酸乙酯 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取当归、川芎对照药材各 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 10 μ l，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶 G 薄层板上，以环己烷-二氯甲烷-乙酸乙酯-甲酸（4:1:1:0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，置氨蒸气中熏数分钟，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0101）。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0512）。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%磷酸（15:85）为流动相；检测波长为 230nm。理论板数按芍药苷峰计算应不低于 4000。

对照品溶液的制备 取芍药苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 中含 50 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品 20 片，除去包衣，精密称定，研细，取约 0.8g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入 60%甲醇 25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率 400W，频率 40kHz）30 分钟，放冷，再称定重量，用 60%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每片含赤芍以芍药苷（C₂₃H₂₈O₁₁）计，不得少于 0.5mg。

【功能与主治】 活血化瘀，温经通络。用于痛经，慢性附件炎。

【用法与用量】 口服。一次 5 片，一日 3 次。

【规格】（1）薄膜衣片 每片重 0.35g（相当于饮片 1.54g）；（2）糖衣片 片芯重 0.33g（相当于饮片 1.54g）

【贮藏】 密封。

湖北省药品标准公示稿