

健脾膏

Jianpi Gao

【处方】 莲子 200g 山药 100g 茯苓 100g
炒稻芽 30g 陈皮 40g 甘草 30g
建曲 30g 炒冬瓜子 40g 大枣 200g
炒麦芽 30g

【制法】 以上十味，加水煎煮（建曲包煎）三次，分别为 1.5、1、0.5 小时，合并煎液，静置沉淀 12 小时以上，滤过，滤液浓缩至相对密度为 1.16~1.17(80℃测定)的清膏，加入转化糖，搅匀，浓缩至规定的相对密度，制成总量 1000g，即得。

【性状】 本品为黄棕色稠厚半流体；味甜。

【鉴别】 (1) 取本品 20g，加水 50ml，搅拌使溶解，加水饱和的正丁醇提取 3 次（30ml、20ml、15ml），合并正丁醇液，用正丁醇饱和的水洗涤 3 次，每次 15ml，取正丁醇液，蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取橙皮苷对照品，加甲醇制成饱和溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以醋酸为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 1%三氯化铝试液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

(2) 取鉴别(1)项下的供试品溶液作为供试品溶液。另取甘草酸铵对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（6:1:3）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 相对密度 应不低于 1.38（中国药典 2025 年版四部通则 0601）。

其他 应符合煎膏剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0183）。

【功能与主治】 健脾益胃，益气养血。用于食欲不振、面黄形瘦、乏力懒言。

【用法与用量】 口服。一次 15~20ml，一日 2~3 次，或遵医嘱。

【注意】 请在医师指导下使用。

【规格】 每 1ml 相当于饮片 1.11g

【贮藏】 密封，置阴凉处。