

热痹清颗粒

Rebiqing Keli

【处方】 生石膏 133.3g 知母 333.3g 赤芍 333.3g
全蝎 333.3g 忍冬藤 500g 车前草 500g
土茯苓 500g 薏苡仁 1000g 甘草 200g

【制法】 以上九味，取薏苡仁 666.7g 粉碎成细粉，备用；剩余薏苡仁及其余八味加水煎煮三次，分别为 2、1.5、1 小时，合并煎液，静置，滤过，浓缩至相对密度为 1.30~1.35（60℃）的清膏，干燥，与上述细粉混合粉碎，加适量乙醇作润滑剂，制成颗粒，干燥，制成 1000g，即得。

【性状】 本品为黄色至黄褐色的颗粒和粉末；气香，味微苦。

【鉴别】 （1）取本品取 8g，研细，加石油醚（60~90℃）20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加石油醚（60~90℃）1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取薏苡仁对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90℃）—乙酸乙酯—醋酸（10:2.5:0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（2）取本品 3g，研细，加乙醚 50ml，置水浴上加热回流 1 小时，滤过，弃去醚液，药渣加甲醇 50ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加水 20ml 使溶解，用水饱和的正丁醇提取 3 次，每次 20ml，合并正丁醇液，用水洗涤 3 次，蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取甘草酸铵对照品，加甲醇制成每 1 ml 含 1 mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2~4μl，分别点于同一用 1% 氢氧化钠溶液制备的硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯—甲酸—冰醋酸—水（15:1:2:2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 硫酸乙醇溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的橙黄色荧光斑点。

（3）取【鉴别】（2）项下的供试品溶液作为供试品溶液。另取芍药苷对照品，加甲醇制成每 1 ml 含 0.5 mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2~4μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷—乙酸乙酯—甲醇—甲酸（8:1:2:0.04）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的蓝紫色斑点。

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0104）。

【功能与主治】 清热利湿，通络止痛。用于类风湿性关节炎、骨关节炎、痛风性关节

炎所引起的关节红肿疼痛、屈伸不利。

【用法与用量】 口服。开水冲服。一次 10g，一日 3 次。

【规格】 每 1g 相当于饮片 5.03g

【贮藏】 密封，置阴凉干燥处。

湖北省药品标准公示稿