

# 头痛灵片

Toutongling Pian

【处方】 钩藤 468g      夏枯草 468g      川芎 187g  
当归 187g      白芍 187g      延胡索 187g  
决明子 468g      细辛 47g      鸡血藤 468g

【制法】 以上九味，取延胡索 187g 及川芎 31g、当归 62g、细辛 12.5g、白芍 19g，粉碎成细粉，过筛，混匀。剩余药味加水煎煮二次，每次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至适量，加入乙醇使溶液中含乙醇量为 50%，静置 24 小时，取上清液，滤过，滤液回收乙醇，浓缩至稠膏状，加入上述细粉及辅料适量，混匀，制成颗粒，压制成 1000 片，包糖衣或薄膜衣，即得。

【性状】 本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后，显棕褐色；气微，味苦。

【鉴别】 取本品 20 片，除去包衣，研细，加乙醇 50ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芍药苷对照品，加乙醇制成每 1ml 含 1mg 溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（40:5:10:0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0101）。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0512）。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1% 磷酸（15:85）为流动相；检测波长为 230nm。理论板数按芍药苷峰计算应不低于 3000。

对照品溶液的制备 取芍药苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 中含 50 $\mu$ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品 20 片，除去包衣，精密称定，研细，取约 1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入 75% 甲醇 50ml，称定重量，超声处理（功率 400W，频率 40kHz）30 分钟，放冷，再称定重量，用 75% 甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 $\mu$ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每片含芍药苷以芍药苷（C<sub>23</sub>H<sub>28</sub>O<sub>11</sub>）计，不得少于 0.35mg。

【功能与主治】 平肝潜阳，活血止痛。用于血管性头痛，慢性偏头痛。

【用法与用量】 口服。一次 4~6 片，一日 3 次。

【规格】 （1）薄膜衣片 每片重 0.35g（相当于饮片 2.67g）；（2）糖衣片 片芯重 0.33g（相当于饮片 2.67g）

【贮藏】 密封。