

莪红胶囊

Ehong Jiaonang

【处方】 莪术 300g 红花 150g 制何首乌 250g
葛根 250g 细辛 50g

【制法】 以上五味，细辛与莪术 200g 低温干燥粉碎成细粉，过筛，混匀，备用。剩条莪术 100g 及其余红花等三味加水煎煮 3 次，分别为 2、1.5、1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为 1.32~1.35（50℃热测）的清膏。加入上述细粉，混匀，制粒，低温干燥，装入胶囊，制成 1000 粒，即得。

【性状】 本品为硬胶囊，内容物为黄色的颗粒和粉末；气香，微苦。

【鉴别】（1）取本品，置显微镜下观察：油细胞多破碎，完整者内含黄色油状分泌物；导管多为螺纹导管、梯纹导管。下皮细胞长方形，壁细波状弯曲，细胞间常夹有类方形或长圆形分泌细胞；非腺毛由 1~7 个细胞组成。

（2）取本品内容物 3g，加乙醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液置水浴上蒸干，残渣加乙醇 5ml 使溶解，作为供试品溶液。另取大黄素对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚(30~60℃)-甲酸乙酯-甲酸(15:5:1)的上层液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点；置氨蒸气中熏后，日光下检视，斑点应为红色。

【检查】 应符合胶囊剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0103）。

【功能与主治】 破瘀活血，通阳止痛。用于顽固性头痛、神经衰弱、眩晕等症。

【用法与用量】 口服。一次 3 粒 一日 3 次；或遵医嘱。

【注意】 请在医师指导下使用。

【规格】 每粒装 0.30g

【贮藏】 密封，置阴凉干燥处。