

## 益肝养阴丸

Yigan Yangyin Wan

【处方】 黄芪 100g 防风 60g 白术 60g  
当归 60g 郁金 60g 北沙参 100g  
枸杞子 80g 白芍 60g 五味子 80g  
山药 100g 薏苡仁 100g 焦山楂 80g  
木香 40g 绵马贯众 60g 丹参 100g  
川楝子 60g

【制法】 以上十六味，取川楝子、绵马贯众加水煎煮三次，每次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩成清膏，备用。其余黄芪等十三味低温干燥后粉碎成细粉，过筛，混匀。用清膏、炼蜜与水的混合液泛丸，每 100g 粉末用 35~45g 炼蜜，整粒，干燥，打光，即得。

【性状】 本品为浅棕色至棕褐色的浓缩水蜜丸；气香，味甜、微苦。

【鉴别】 （1）取本品，置显微镜下观察：纤维成束或散离，壁厚，表面有纵裂纹，两端断裂成帚状或较平截（黄芪）。草酸钙簇晶直径 18~32 $\mu$ m，存在于薄壁细胞中，常排列成行，或一个细胞中含数个簇晶（白芍）。种皮石细胞淡黄色，形状不规则，壁波状弯曲，壁厚木化，层纹可见（枸杞子）。草酸钙针晶束存在于粘液细胞中，针晶束长 80~240 $\mu$ m，直径 2~5 $\mu$ m，先端稍尖或平截（山药）。

（2）取本品 20g，碎细，加三氯甲烷 30ml，超声处理 20 分钟，过滤，滤液浓缩至 1ml，作为供试品溶液。另取五味子甲素对照品适量，加无水乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5~10 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 GF<sub>254</sub> 薄层板上，以石油醚（60~90℃）-甲酸乙酯-甲酸（15:5:1）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

（3）取本品 10g，研细，加石油醚（60~90℃）20ml，超声处理 15 分钟，滤过，滤液挥干，残渣加石油醚 1ml 溶解，作为供试品溶液。另取当归对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯（17:3）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的两个亮蓝色荧光斑点。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0108）。

【功能与主治】 疏肝解毒，益气养阴，扶正祛邪。用于慢性乙型肝炎。

【用法与用量】 口服一次 6g，一日 3 次，或遵医嘱。

【注意】 请在医师指导下使用。

【规格】 每 1g 相当于饮片 1.18g

【贮藏】 密封，置阴凉处。

湖北省药品标准公示稿