

## 妇科灌肠液

Fuke Guanchang Ye

【处方】 三棱 60g            莪术 60g            红花 120g  
          大血藤 120g        败酱草 120g        野菊花 120g  
          紫花地丁 120g

【制法】 以上七味，取三棱、莪术、大血藤、败酱草、紫花地丁等五味加水煎煮 1.5 小时，煎液滤过，药渣加入野菊花、红花煎煮二次，每次分别为 1 小时、0.5 小时，合并煎液，静置 12 小时以上，滤过，滤液浓缩至适量，加入苯甲酸钠 3g，搅匀，调整总量至 1000ml，即得。

【性状】 本品为棕红色至棕褐色的液体。

【鉴别】 (1) 取本品 30ml，加硅藻土 20g 拌匀，加甲醇 30ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取紫花地丁对照药材 2g，加水 100ml，煎煮 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述供试品溶液 5~10 $\mu$ l、对照药材溶液 10 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（5：3：1）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 三氯化铁乙醇溶液，热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

(2) 取本品 50ml，用盐酸调节 pH 值至 2，用乙醚振摇提取 3 次，每次 20ml，合并乙醚液，挥干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取大血藤对照药材 5g，加水 100ml，煎煮 1 小时，滤过，滤液加盐酸调节 pH 值至 2，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 $\mu$ l，分别点于同一用硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-丙酮-甲酸（8:1:0.8）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 2% 三氯化铁乙醇溶液，105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 相对密度 应为 1.02~1.05（中国药典 2025 年版四部通则 0601）。

pH 值 应为 5.0~6.0（中国药典 2025 年版四部通则 0631）。

其他 应符合灌肠剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0129）。

【功能与主治】 清热解毒，化瘀消肿。用于热毒血瘀所致的急慢性盆腔炎，炎性包块。

【用法与用量】 睡前灌肠。一次 100ml，保留 2 小时以上，一日一次。

【注意】 妇女经期禁用；孕妇禁用。

【规格】 每 1ml 相当于饮片 0.72g

【贮藏】 密封，置阴凉处。