

妇科洗剂

Fuke Xiji

【处方】 苦参 黄柏 百部
蛇床子 地肤子 白矾

【制法】 以上六味，除白矾外，其余五味加水煎煮 3 次，分别为 1.5、1、0.5 小时，合并煎液，加入白矾，搅溶，静置沉淀 12 小时以上，滤过，滤液浓缩至适量，加入苯甲酸钠 3g，加水调整总量至 1000ml，即得。

【性状】 本品为黄褐色液体。

【鉴别】 （1）取本品 30ml，加氨试液使呈碱性，用三氯甲烷提取 2 次，每次 20ml，合并三氯甲烷液，蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取苦参碱对照品，加乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2~5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-丙酮-甲醇(8: 3: 0.5)为展开剂，置氨蒸气饱和的展开缸内展开，取出，晾干，喷以稀碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（2）取鉴别（1）项下的供试液作为供试品溶液。另取盐酸小檗碱对照品，加乙醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 0.5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-异丙醇-甲醇-水-三乙胺（3: 3.5: 1: 1.5: 0.5: 1）为展开剂，置氨蒸气饱和的层析缸内展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 相对密度 应不低于 1.04（中国药典 2025 年版四部通则 0601）。

pH 值 应为 3.0~5.0（中国药典 2025 年版四部通则 0631）。

其他 应符合洗剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0127）。

【功能与主治】 清热解毒，杀虫，利湿。用于湿毒所致的滴霉菌性阴道炎、一般性阴道、老年性阴道炎及皮肤瘙痒症等

【用法与用量】 坐浴，冲洗。一次 100ml，加温开水至 1000ml，一日 1 次，皮肤瘙痒本品适量外搽患处，一日 3 次；或遵医嘱。

【注意】 妇女经期只宜外洗,禁坐浴冲洗;请在医师指导下使用。

【规格】 每 1ml 相当于饮片 0.72g

【贮藏】 密封，置阴凉处。