

# 黄 芩 炭

## Huangqintan

本品为唇形科植物黄芩 *Scutellaria baicalensis* Georgi 的干燥根的炮制加工品。

**【炮制】** 取净黄芩片，照炒炭法（《中国药典》2015年版四部通则 0213）炒至表面焦黑色。

**【性状】** 本品呈类圆形或不规则的薄片。表面焦黑色，切面棕褐色至黑色，质酥脆。具焦香气。

**【鉴别】** 取本品粉末 1g，加乙酸乙酯-甲醇（3:1）的混合溶液 30ml，加热回流 30 分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 5ml 使溶解，取上清液作为供试品溶液。另取黄芩素对照品、汉黄芩素对照品，加甲醇分别制成每 1ml 各含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2015年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 1 $\mu$ l，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以甲苯-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（10:3:1:2）为展开剂，预饱和 30 分钟，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的暗色斑点。

**【检查】** 水分 不得过 6.0%（《中国药典》2015年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（《中国药典》2015年版四部通则 2302）。

**【浸出物】** 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2015年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 22.0%。

**【性味与归经】** 苦，寒。归肺、胆、脾、大肠、小肠经。

**【功能与主治】** 清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。用于湿温、暑湿，胸闷呕恶，湿热痞满，泻痢，黄疸，肺热咳嗽，高热烦渴，血热吐衄，痈肿疮毒，胎动不安。

**【用法与用量】** 3~10g。

**【贮藏】** 置通风干燥处，防潮。