

香 墨

Xiangmo

本品为松烟、明胶、冰片、薄荷素油等加工制成的墨。

【处方】 松烟 600g 明胶 400g 冰片 8g 薄荷素油 2ml

【制法】 取冰片、薄荷素油用适量乙醇溶解，备用；取明胶加 2.5~3 倍量的水浸泡 30 分钟，加热至流体状，备用；取松烟（过 60 目筛）置和药机内，趁热加入明胶液，搅拌，再加入冰片和薄荷素油混合溶液，制成软材。软材倒入碾压机中碾压数分钟，除去气泡，再倒入模具中，压模成型，阴干，即得。

【性状】 本品呈长方形或圆柱形块状物，表面黑色，有光泽。质坚硬，断面略显平坦。具墨香气，味淡。

【鉴别】 取本品粉末 20g，置烧瓶中，加水 250ml，照挥发油测定法（《中国药典》2015 年版四部通则 2204）试验，自挥发油测定器上端加入石油醚（60~90℃）1.5ml，加热至沸并保持微沸 1 小时，放冷，分取石油醚液，作为供试品溶液。另取冰片对照品，加乙酸乙酯制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2015 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯（19:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 10.0%（《中国药典》2015 年版四部通则 0832 第四法）。

酸不溶性灰分 不得过 5.0%（《中国药典》2015 年版四部通则 2302）。

饮片

【炮制】 用时捣碎或研末。

【性味与归经】 辛，平。归心、肝经。

【功能与主治】 止血，消肿。用于吐血、衄血，崩中漏下，血痢，痈疽发背。

【用法与用量】 入丸、散，1~3g。外用适量，研末外敷。

【贮藏】 置干燥处，防潮。